

LISTA DE MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS CONTRAINDICADAS EN MIASTENIA

Acebutalol (4)	Acrosoxacina (4)	Amantadina (4)	Amikacina (4)
Amitriptilina (4)	Ampicilina (4)	Anfetamina (4)	Anovulatorios (4)
Antidepresivos Fuertes (4)	Antitoxina tetánica (4)	Aprotinin (Trasylol) (4)	Artane (4)
Atenolol (2)	Azitromicina (3)	Bacitracina (4)	Barbitúricos (4)
Benzodiazepina (3)	Betabloqueantes (2)	Betaxolol (4)	Bisopropol (4)
Bretylium (4)	Calmantes (4)	Capreomicina (4)	Carnitina (2)
Carvedilol (4)	Celipropol (4)	Ciclopropano (4)	Cinoxacina (4)
Ciprofloxacina (2)	Claritromicina (2)	Clidomicina (4)	Clindamicina (4)
Clomipramina (4)	Cloroformo (4)	Cloropromazina (4)	Cloroquina (1)
Clorpromazina (4)	Clozapina (4)	Cocaína (4)	Atracurio (3)
Colistimethate (4)	Colistina(3)	Contrastes Iodados (2)	Curare
Desipramina (4)	Diazepam (4)	Dibenkacina (4)	Dibenzepina (4)
Difenhidramina (4)	Dihidolestreptomicina (4)	Diuréticos (4)	Doxepina (4)
Doxiciclina (4)	Droperidol (4)	Echotiophate (4)	Emetina (4)
Enemas (4)	Eritromicina (3)	Esmolol (4)	Estreptomicina (3)
Estrógenos (4)	Éter (4)	Fenelzina (4)	Fenitoína (3)
Fenotiazinas (4)	Flavoxate (4)	Fluoroquinolas (2)	Flupenazina (4)
Flupentixol (4)	Fosfatos Orgánicos (4)	Fosmomicina (4)	Fritomicina (4)
Gentamicina (4)	Guanadrel (4)	Guanetidina (4)	Haloperidol (4)
Halotano (4)	Hematropina (4)	Hexametonio (4)	Hidroxiclороquina (3)
Hormonas (4)	Imipenen (4)	Imipramina (4)	Interferón Alfa (3)
Isocarboxazida (4)	Kanamicina (4)	Labetolol (2)	Lactato de sodio
Licomicina (4)	Lidocaína (4)	Limeciclina (4)	Litio (3)
Loxapina (4)	Magnesio en altas cantidades (1)	Mecamilamina (4)	Mefenitoina (4)
Meprobamato (4)	Metopropol (2)	Metotrimeprazina	Metoxi Flurano (4)

Minociclina (4)	Morfina (4)	Nadolol (2)	Nalidixic Acid (4)
Neomicina (4)	Netilmicina (4)	Nicotina (4)	Norfloxacin (4)
Nortroptilina (4)	Ofloxacin (4)	Olanzapina (4)	Oprimamol (4)
Oxipertina (4)	Oxitetraciclina (4)	Oxprenolol (2)	Oxybutinina (4)
Oxyptertina (4)	Oxytetracyclina	Pacitracina (4)	Paraldeido (4)
Parches Nicotina (4)	Paromomicina (4)	Penicilina (4)	Penicilina D (4)
Perfenazina (4)	Periciazina (4)	Pericyazina (4)	Pimozida (4)
Pindolol (4)	Polimixina B (4)	Polimixina D (4)	Practolol (2)
Procaína (4)	Procainamida (3)	Prochlorperazina (4)	Progesterona (4)
Promazina (4)	Promazine (4)	Propanolol (4)	Propantelina (4)
Protiltilina (4)	Pyrithioxin (4)	Quinidina (2)	Quinina (4)
Relajantes Musculares (4)	Risperidona (4)	Rolitetraciclina (4)	Sisomicina (4)
Sotalol (4)	Succinicolina (4)	Sulfonamidas (4)	Sulpirida (4)
Telitromicina (1)	Tetraciclina (4)	Thioridazina (4)	Timolol (2)
Tiopronine (4)	Tioridazina (4)	Tirotricina (4)	Tobramicina (4)
Tranilcipromida (4)	Tranylcypramina (4)	Tricloroetanol (4)	Trifluoroperazina (4)
Trihexifenidil (4)	Trimetadiona (4)	Trimethaphan (4)	Trimipramina (4)
Levofloxacin (2)	Aminoglicosidos (2)	D-Penicilamina (2)	Toxina Botulinica (2)
Vancomicina (4)	Verapamil (2)	Viomicina (4)	Zuclopentixol (4)

(1) ALTO RIESGO

(2) RIESGO MEDIO, USAR SOLO SI ES NECESARIO DE VIDA O MUERTE, BAJO VIGILANCIA MEDICA

(3) POSIBLE RIESGO, USAR BAJO OBSERVACION MEDICA

(4) DUDOSO, NO NECESARIAMENTE CONTRAINDICADO EN ALGUNOS PACIENTES, PERO TENER CUIDADO.

Estas son algunas Drogas, Sustancias y Medicamentos que se usan médicamente y que pueden causar el aumento de los síntomas en la Miastenia. Si es necesario el uso de alguno de estos, debe hacerse bajo estricta vigilancia del médico. Algunos de estos medicamentos pueden ser necesarios para el tratamiento de otras enfermedades en un miasténico en caso de emergencias. Se puede dar el caso que algunos de estos medicamentos actúen diferente en cada persona con miastenia.

Fuente: ASOCIACION MIASTENIA PERU

www.miasteniaperu.org